



Le Putois d'Europe

Photo: © François Sabathé

Identification



Le Putois d'Europe (*Mustela putorius*) a, comme la majorité des mustélidés, une **forme allongée** et les pattes courtes. Il est souvent confondu avec les visons dont il se distingue par son **masque facial**.



Comportement

Plutôt **solitaire**, ce mustélidé actif toute l'année, ne recherche ses congénères qu'au moment du rut, vers mars-avril. La taille du domaine vital, de l'ordre d'1 km², est assez réduite et les individus se déplacent peu. Prédateur généraliste et opportuniste, le Putois a un régime alimentaire très carné, basé sur la capture de divers vertébrés. Il utilise son domaine vital selon la disponibilité des proies. Il peut être de ce fait qualifié de « **spécialiste saisonnier** ».

Ecologie

Souvent associé aux **zones humides**, le milieu de vie du Putois est constitué d'un **paysage diversifié**, son optimum étant composé d'une alternance de boisement et de zones humides. Les haies, les lisières et les milieux humides et aquatiques représentent des corridors de déplacement, dont la **connectivité** est favorable à l'espèce. C'est une espèce emblématique de la Trame verte et bleue !



Une espèce menacée





→ Perte / dégradation / fragmentation de ses habitats

→ Collisions routières

→ Diminution, voir disparition de certaines populations de proies (notamment amphibiens et Lapin de garenne (*Oryctolagus cuniculus*))


→ Piégeage



Aidez-nous !

Objectif : amélioration des connaissances

- Transmettez vos observations via GeoNat' Occitanie : <https://geonature.biodiv-occitanie.fr>
- Participez à la détection de l'espèce grâce à la pose d'appareils photographiques ou de tunnels à empreintes
- **Protocole** de détection avec un arbre décisionnel basé sur la saison et l'habitat



Echantillonnage avec 3 dispositifs par maille

Durée de 6 semaines max Avec 1 relevé tous les 15 jours

Relevé de variables

Localisation des dispositifs de détection

Bocage avec réseau de haie important En été (juin à août) et en hiver (déc. à fév.)

Boisement avec à proximité des bâtiments agricoles En automne (sept. à nov.) et en hiver (déc. à fév.)

À proximité d'un cours d'eau En toute saison

	Milieux humides Bords de rivière, fossés en eau, lacs, étangs, marais, tourbières	Bocage/Lisière Lisières forestières, haies, friches, paysage agricole diversifié	Petits Boisements Bosquets, petits boisements, clairières
Printemps (mars à mai)	3		
Été (juin à août)	2	1	
Automne (sept. à nov.)	2		1
Hiver (déc. à fév.)	1	1	1

